

# Impfschema

## Angaben zum Impfschema

Heute werden die einzelnen Komponenten nicht mehr getrennt geimpft und was die wichtigste Änderung ist, die Welpenimpfserie wird nicht vor der 15.-16. LW abgeschlossen, das heißt es wird mindestens einmal mehr geimpft (z.B. 8.+12.+16. Lebenswoche). Je nach Infektionsrisiko und maternaler Versorgung kann mit der Welpenimpfserie auch vor einem Alter von 8 Wochen begonnen werden (aber ebenfalls erst mit 16 Wochen beendet werden). Wichtig ist auch, dass die Grundimmunisierung erst im 15. Lebensmonat mit einer weiteren Boosterung abgeschlossen wird, erst ab dann können, je nach individueller Situation (wie hoch ist das Infektionsrisiko?) die Impfintervalle verlängert werden (für HCC, Parvovirose, Staupe und Tollwut, nach Empfehlung des Impfstoffherstellers). Für Leptospirose ist eine zumindest jährliche Wiederholungsimpfung zu empfehlen.

**8 Lebenswochen: HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe**

**12 Lebenswochen: HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe, Tollwut**

**16 Lebenswochen: HCC, Parvovirose, Staupe, Tollwut**

**15 Lebensmonaten: HCC, Leptospirose, Parvovirose, Staupe, Tollwut**

Mit freundlichen Grüßen

Klinische Virologie  
Department für Pathobiologie  
Veterinärmedizinische Universität Wien



HOKAMIX<sup>30</sup>

# grau-tiernahrung.de

grau GmbH • 46419 Isselburg • Tel. 02874 9142-0 • Fax 02874 4331 • info@grau-gmbh.de



Fordern Sie kostenlos unsere Spezialkataloge für Hunde und Katzen an.